



## [사용상 주의사항]

### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- ① 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
- ② 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- ③ 유·소아

### 2. 이상반응

피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은반점), 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리(벗겨짐), 자통(刺痛) 따르는 것 같은 아픔, 작열감(화끈감)이 적용부위에 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

### 3. 일반적주의

- ① 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지면 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- ② 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
- ③ 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진단학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행한다.
- ④ 에탄올 등의 알코올성 기제가 국소자극을 일으킬 수 있으므로 영아(젖먹이, 갓난아기), 유아 또는 점막부위에 이 약 투여 시 주의한다.
- ⑤ 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(젖먹이, 갓난아기)(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의한다.

### 4. 임부 및 수유부에 대한 투여

- ① 동물에 대한 생식독성시험에서 태자독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임신 중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우뚱)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- ② 이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.

### 5. 소아에 대한 투여

본 제품은 15세 미만의 소아에 대해 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 이 약을 15세 미만의 소아에 투여하지 않는다.  
(유·소아에 대한 사용경험이 적다.)

### 6. 과량투여시의 처치

실수로 이 약을 복용한 경우에는 위세척 등의 적절한 처치를 한다.

### 7. 적용상의 주의

- ① 이 약은 외용으로만 적용한다.
- ② 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 않는다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.
- ③ 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 않는다.
- ④ 자극을 일으킬 수 있으므로 균열(갈라짐), 미란(짓무름) 부위에는 주의하여 사용한다.

### 8. 저장상의 주의사항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- ② 15~30℃ 에서 보관한다.

### [저장방법]

기밀용기, 15~30℃ 보관

### [포장단위] 4g

※ 작성년월일: 2016년 9월 30일

\* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품을 구입하였을 때에는 구입한 약국, 도매상, 병의원을 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의 사항은 당사 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.(Tel:080-901-4100)

\* 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 자사 홈페이지(www.kr.gsk.com) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)참조

\* 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관합니다.

\* 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.

\* 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

### [전공정위탁제조(제조사)]

Novartis Consumer Health SA,  
Route de l'Etraz, 1260 Nyon,  
스위스

### [일부공정위탁제조(제조사)]

Fondation Polyval, Route de  
Divonne 48, 1260 Nyon,  
스위스 (2차 포장)

### [수입자]

(주)글락소스미스클라인켄슈머헬스케어코리아

서울특별시 용산구 한강대로 92, 9층 (한강로2가, LS용산타워)  
고객센터(수신자 요금부담): 080-901-4100

(주)글락소스미스클라인켄슈머헬스케어코리아

제품 사용 중 발생한 유행사례(부작용)는 080-901-4100 또는  
kr-medical.drug-safety@gsk.com으로 보고해 주시기 바랍니다.



KR 938096 - KR 151906

수입완제품 | 일반의약품

## [원료약품 및 그 분량]

이 약 1g중,  
주성분: 테르비나핀염산염(별규).....11.25mg  
(테르비나핀으로써 10mg)

## [성상]

이 약은 무색투명-옅은 황색으로 에탄올의 특이한 냄새가 있는 외용액이다.

## [효능·효과]

Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부감염증: 족부백선(발백선증, 무좀)(15세 이상의 청소년 및 성인에 한함)

## [용법·용량]

이 약은 단 1회 적용한다.

적용 전에 환부(질환부위)를 깨끗이 씻고, 완전히 건조시킨 후 환부(질환부위)와 그 주위가 충분히 적셔지도록 충분한 양을 바른다. **진균(곰팡이)의 완벽한 치료를 위해서는 병소(아픈부위)가 나타나지 않은 쪽 발이라 할지라도, 양쪽 발 모두에 적용한다.**

이 약을 발가락 사이 모두 얇게 펴 바르고 발바닥 전체와 발바닥으로부터 1.5cm 높이까지 이 약을 적용하며 1~2분간 건조시킨다. 이 약 적용 시에는 문질러 바르지 않는다. 사용 후에는 손을 깨끗이 세척한다.

이 약의 효과를 높이려면 **적용 후 24시간 동안 씻지 않고 그대로 둔다.** 1주가 지난 후에도 개선의 징후가 보이지 않으면, 의사나 약사와 상담한다.

